

ราชชนนี
๕๗/๖๕
ที่ สด ๐๕๑๘/ว ๘๒๖



๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
รับที่.....๕๗/๖๕
วันที่.....๕ ส.ค. ๖๕
ที่ว่าการอำเภอท่าแพ.....๐๗.๕๕ น.

ถนนฉลุง - สะงู สด ๙๑๑๕๐

ถาวรสารณสุข
เลขที่.....๗๐๓
วันที่.....๕ ก.ค. ๖๕
เวลา.....๑๕.๐๐ น.

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โรคฝีดาษวานร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

ตามที่ ปรากฏพบผู้ติดเชื้อโรคฝีดาษวานรยืนยันรายแรกในประเทศไทย โดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ นั้น

อำเภอท่าแพ พิจารณาแล้ว ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้

๑.ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้เกิดความตระหนักรู้และเน้นย้ำให้เข้าใจแนวทางการป้องกันโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยการป้องกันแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

๒. พื้นที่ที่มีจุดผ่านแดนบริเวณชายแดน ให้เฝ้าระวังบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศกลุ่มเสี่ยงโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิด

๓.กรณีพบผู้สงสัยว่าจะติดเชื้อหรือตรวจพบเชื้อยืนยัน ให้กักกันตัวเพื่อสอบสวนโรคและรักษาโรคตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และรายงานให้จังหวัดสตูลทราบโดยด่วน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน นายก อบต.ท่าแพ

- ๐.ท่าแพ ขอความร่วมมือ
- ประชาสัมพันธ์โรคฝีดาษวานร
- เพื่อโปรดทราบ.

๕ ส.ค. ๖๕

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระพงษ์ คุ้มเคี่ยม)

นายอำเภอท่าแพ

- ๗๕๑๖๗๕

ที่ทำการปกครองอำเภอ

สำนักงานอำเภอ

โทร.๐-๗๔๗๘-๗๑๑๑

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์

(นายบุญยัติ หัสมา)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ภูมิราชการแทน

ผู้ช่วย

(นางสาวอิสราพร น้อยดำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

- ดำเนินการ


(นายบุญดิน หึงน้ารอบ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ฟีดาวานร... ป้องกันได้



ล้างมือบ่อยๆ



เว้นระยะห่าง



เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่ไม่รู้จัก



ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น



เสี่ยงใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง



กินอาหารปรุงสุก



สงสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันที

ทุกคนยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอ



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคฝีดาษวานร ประเทศไทย

- เฝ้าระวัง คัดกรอง ผู้ป่วยสงสัยฯ ในสถานพยาบาลทุกแห่ง คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งด้านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (สนามบินนานาชาติ) และเก็บตัวอย่างส่งตรวจฯ เพื่อยืนยันการติดเชื้อ 2 แห่ง
- การสอบสวน และควบคุมโรค เน้นผู้ป่วยทุกรายต้องได้รับการแยกกัก รวมทั้งขณะรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ หากพบผู้ป่วยยืนยันจำเป็นต้องได้รับการรักษา และแยกกักในรพ./ห้องแยกโรค จนพ้นระยะปลดการแพร่โรค
- กรณีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ผู้ที่มีประวัติสัมผัสโดยตรงกับตุ่มพื่นของผู้ป่วย รวมทั้งเสื้อผ้า สิ่งของของผู้ป่วย ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองอย่างน้อย 21 วัน หากเริ่มมีอาการไข้ ไอ ตุ่มพื่นขึ้นให้รีบพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยรักษา รวมทั้งเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

คำแนะนำในการป้องกันโรคฝีดาษวานร สำหรับประชาชน

- โรคฝีดาษวานร ติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงกับตุ่มพื่น / สิ่งของที่ใช้ร่วมกับผู้ป่วย ให้เสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย
- Universal Prevention : เน้นการล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง